

P LLTest

1. De los siguientes fármacos Antidiabéticos Orales, cuál tiene mayor probabilidad de provocar hipoglucemias?

1. iDPP4
2. Metformina
3. Sulfonilurea
4. Glitazona

2. ¿Qué fármacos presentan la menor potencia teórica de reducción de HbA1c?

1. Sulfonilureas
2. Inhibidor de la alfa-glucosidasa
3. iDPP4
4. Pioglitazona

3. En el manejo de la Diabetes en el paciente anciano, cuál es uno de los principales factores a evitar?

1. Hiperglucemia
2. Hipoglucemia
3. Alteraciones Gastrointestinales
4. Prurito

4. El uso de Análogos Basales de Insulina está justificado frente a NPH, sobre todo en los casos de:

1. Pacientes diabéticos ancianos con antecedentes de hipoglucemias
2. Diabéticos tipo 2 que precisan dos dosis diarias de NPH
3. Pacientes con dificultad para reconocer hipoglucemia y actuar para controlarlas
4. Todas son correctas

5. Los fármacos inhibidores de la DPP IV

1. Provocan menos hipoglucemias que otros secretagogos
2. Provocan menos ganancia ponderal que Sulfonilureas
3. Su uso está permitido en Insuficiencia Renal leve-moderado, en algunos casos con ajustes de dosis.
4. Todas son correctas.