


Grupo Andaluz Vacunación AntiGripal



Córdoba, Delegación Territorial de Salud y Familias
25 octubre 2019

Escuela Andaluza de Salud Pública
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

INSTRUCCIÓN DGSPyOF-6/2019

**RECOMENDACIONES DE VACUNACION ANTIGRIPIAL EN ANDALUCIA
TEMPORADA 2019-2020**

Recomendaciones vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

Fecha de inicio de la campaña de vacunación antigripal

En Andalucía, la fecha de inicio de la campaña de vacunación antigripal para la temporada 2019-2020 será el día **28 de octubre de 2019**. Salvo comunicación explícita de la finalización de la misma debemos continuar con la campaña vacunal con el fin de vacunar a todas las personas en las que esté indicada, independiente del tiempo transcurrido desde su inicio.

Recomendaciones vacunación antigripal Andalucía 2019-2020



Recomendaciones
vacunación antigripal
Andalucía 2019-2020

1. Personas de 65 años o más.



Recomendaciones vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

2. Personas que presentan un alto riesgo de complicaciones derivadas de la gripe:

- Personas en edad infantil (a partir de los 6 meses de edad), adolescente o adulta:
 - Enfermedades crónicas cardiovasculares (excluyendo hipertensión arterial aislada), neurológicas o respiratorias, incluyendo displasia bronco-pulmonar, fibrosis quística y asma.
 - Diabetes mellitus
 - Obesidad mórbida (índice de masa corporal ≥ 40 en adultos, ≥ 35 en adolescentes o ≥ 3 DS en la infancia)
 - Enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico
 - Hemoglobinopatías y anemias
 - Trastornos de la coagulación
 - Hemofilia y trastornos hemorrágicos crónicos, así como receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples
 - Asplenia o disfunción esplénica grave
 - Enfermedad hepática crónica, incluyendo alcoholismo crónico



Recomendaciones vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

2. Personas que presentan un alto riesgo de complicaciones derivadas de la gripe:

- Enfermedades neuromusculares graves
- Inmunodeficiencias primarias, incluyendo déficit de complemento
- Inmunodeficiencias adquiridas, incluyendo la originada por la infección por VIH, por fármacos (ej: inmunosupresores, eculizumab), receptores de trasplantes
- Cáncer y hemopatías malignas
- Implante coclear o en espera del mismo
- Fístula de líquido cefalorraquídeo
- Enfermedad celíaca
- Enfermedad inflamatoria crónica (ej: artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, enfermedad inflamatoria intestinal,...)
- Trastornos y enfermedades que conllevan disfunción cognitiva: síndrome de Down, demencias y otras
- Personas institucionalizadas de manera prolongada



Recomendaciones vacunación antigripal Andalucía 2019-2020



2. Personas que presentan un alto riesgo de complicaciones derivadas de la gripe:

- Mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación
- Personas de edad entre los 6 meses y los 18 años de edad, que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico, por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Reye tras la gripe
- Menores entre los 6 meses y los 2 años de edad con antecedentes de prematuridad menor de 32 semanas de gestación

En este grupo 2 se hará un especial énfasis en aquellas personas que precisen seguimiento médico periódico o que hayan sido hospitalizadas en el año precedente.

Recomendaciones vacunación antigripal Andalucía 2019-2020



3. Personas que pueden transmitir la gripe a aquellas que tienen un alto riesgo de presentar complicaciones:

- Personal de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, tanto de atención primaria como especializada y hospitalaria, pública y privada, así como personal de oficinas de farmacia. Se hará especial énfasis en el personal que tiene contacto mantenido con pacientes de algunos de los grupos de alto riesgo anteriormente descritos.
- Personas que trabajan en instituciones geriátricas o en centros de atención a enfermos crónicos, especialmente los que tengan contacto continuo con personas vulnerables.
- Estudiantes en prácticas en centros sanitarios.
- Personas que proporcionen cuidados domiciliarios a pacientes de alto riesgo o mayores (definidos en apartados 1 y 2).
- Personas con edad a partir de los 6 meses de edad que conviven en el hogar con personas con patologías o situaciones descritas en el apartado 2.

Recomendaciones vacunación antigripal Andalucía 2019-2020



4. Otros grupos en los que se recomienda la vacunación:

- Personas que trabajan en servicios públicos esenciales, con especial énfasis en los siguientes subgrupos:
 - Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con dependencia nacional, autonómica o local.
 - Bomberos.
 - Servicios de protección civil.
 - Personas que trabajan en los servicios de emergencias sanitarias.
 - Personal de instituciones penitenciarias y de otros centros de internamiento por resolución judicial (incluyendo centros de acogida de inmigrantes).
- Personas con exposición laboral directa a aves domésticas o a cerdos en granjas o explotaciones avícolas o porcinas y también a aves silvestres. La finalidad es reducir la oportunidad de una infección concomitante de virus humano y aviar o porcino, disminuyendo la posibilidad de recombinación o intercambio genético entre ambos virus.

Preparados de vacunas disponibles: **Andalucía, campaña 2019-2020**

Composición de las vacunas para la temporada 2019-2020

En el mes de febrero de cada año, la OMS publica la composición de la vacuna para su utilización en el hemisferio norte.

Las vacunas trivalentes recomendadas para esta temporada 2019-2020 deberán contener los siguientes componentes:

- cepa análoga a A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09
- cepa análoga a A/Kansas/14/2017 (H3N2)
- cepa análoga a B/Colorado/06/2017 (linaje B/Victoria/2/87)

Dosis de vacunas:

Andalucía, campaña 2018-2019

1.191.507
dosis

+15%



Andalucía, campaña 2019-2020

1.370.656
dosis

Preparados de vacunas disponibles:

Andalucía, campaña 2019-2020

Vacunas trivalentes

Chiroflu[®] (Seqirus)

No adyuvada, para ≥ 6 meses

Vaxigrip[®] (Sanofi)

No adyuvada, para ≥ 6 meses

Chiromas[®] (Seqirus)

Adyuvada, para ≥ 65 años

Preparados de vacunas disponibles: Andalucía, campaña 2019-2020



- CHIROFLU® (Seqirus Spain, S.L.):

Es una vacuna trivalente de antígenos de superficie purificados, inactivados. Esta vacuna se administrará a **niños a partir de 6 meses de edad, adolescentes y adultos de cualquier edad** en los que esté indicada la vacunación. Se puede emplear en embarazadas. Puede contener trazas de huevo, como ovoalbúmina o proteínas de pollo.

Presentación: Caja con 10 jeringas precargadas con sistema Luer lock. Cada jeringa contiene 0,5 ml de suspensión, suministrada con aguja dotada de mecanismo de bioseguridad en distinta caja a la de las vacunas. Se debe retirar el tapón de la jeringa, y después colocar la aguja para su administración.

Preparados de vacunas disponibles: Andalucía, campaña 2019-2020



- VAXIGRIP® (Sanofi Pasteur):

Es una vacuna trivalente de virus fraccionados e inactivados. Esta vacuna se administrará a **niños a partir de 6 meses de edad, adolescentes y adultos de cualquier edad** en los que esté indicada la vacunación. Se puede emplear en embarazadas. Puede contener trazas de huevo, como ovoalbúmina o proteínas de pollo.

Presentación: Caja unitaria con jeringa precargada con 0,5 ml de suspensión, con aguja fija y protegida con un tapón de émbolo.

Preparados de vacunas disponibles: Andalucía, campaña 2019-2020



- CHIROMAS® (Seqirus Spain, S.L.):

Es una vacuna trivalente inactivada con un adyuvante en forma de suspensión oleosa MF59C.1, que aumenta la inmunogenicidad vacunal. Su empleo debe ser solo en **personas de edad igual o mayor de 65 años**, por indicación de su ficha técnica. En esta campaña se utilizará preferentemente en personas a partir de 65 años residentes en **instituciones**. No debe emplearse en embarazadas ni en personas de menos de 65 años. Puede contener trazas de huevo, como ovoalbúmina o proteínas de pollo.

Presentación: Caja con 10 jeringas precargadas con sistema Luer lock. Cada jeringa contiene 0,5 ml de suspensión, suministrada con aguja dotada de mecanismo de bioseguridad en distinta caja a la de las vacunas. Se debe retirar el tapón de la jeringa, y después colocar la aguja para su administración.

Preparados de vacunas disponibles: Andalucía, campaña 2019-2020

Esquemáticamente, por grupos de edad y estado, las vacunas a emplear serían:

- **Niños ≥ 6 meses y adolescentes** con indicación de vacunación: se puede administrar Chiroflu® o Vaxigrip®.
- **Adultos de 18 a 64 años** con indicación de vacunación: se puede administrar Chiroflu® o Vaxigrip®.
- **Embarazadas:** se puede administrar Chiroflu® o Vaxigrip®.
- **Adultos ≥ 65 años:** Se puede administrar Chiroflu® o Vaxigrip®. Se puede administrar Chiromas®, aunque en esta campaña se utilizará preferentemente en personas a partir de 65 años residentes en instituciones.

| INDICACIÓN | PRESENTACION |
|---|---|
| <p>Personas de cualquier edad desde los 6 meses de vida (incluidas las embarazadas y personas ≥ 65 años)</p> | <p>CHIROFLU®</p>  |
| | <p>VAXIGRIP®</p>  |
| <p>Personas de 65 años y mayores (preferentemente residentes en instituciones)</p> | <p>CHIROMAS®</p>  |

Recomendaciones vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

Siempre 0,5 ml

Cómo se administra la vacuna de la gripe, dosis según edad

- En los niños de entre 6 meses y 9 años de edad que se vacunan por primera vez, se administrarán 2 dosis de 0,5 ml, separadas por al menos un mes. En las temporadas siguientes se administrará una sola dosis cada año.
- A partir de los 9 años: una dosis de 0,5 ml.

Recomendaciones vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

Siempre 0,5 ml

Forma de administración

Se recomienda la administración por **vía intramuscular**.

En el caso de Chiroflu[®] y Vaxigrip[®], se pueden administrar también por vía subcutánea profunda. Chiromas[®] no debe administrarse por vía subcutánea bajo ninguna circunstancia.

Recomendaciones vacunación antigripal Andalucía 2019-2020



Contraindicaciones generales de la vacunación antigripal

La vacunación frente a gripe está contraindicada en:

- Reacción anafiláctica o alérgica grave a alguno de los componentes de la vacuna (excepto al huevo).
- En aquellas personas que hayan tenido una reacción alérgica a una dosis anterior de vacuna antigripal.
- En los menores de 6 meses de edad.

Recomendaciones vacunación antigripal Andalucía 2019-2020



Precauciones

Se recomienda seguir las siguientes precauciones:

- **Enfermedad febril o cualquier proceso agudo moderado o grave:** se recomienda posponer la vacunación. No es necesario retrasarla ante procesos leves.

Recomendaciones vacunación antigripal Andalucía 2019-2020



Precauciones

- **Alergia al huevo:** todas las vacunas que se administrarán esta temporada son inactivadas y están cultivadas en huevos embrionados de pollo, por lo que pueden contener pequeñas cantidades de proteínas de huevo. El riesgo de desarrollar una reacción, en personas alérgicas al huevo es muy bajo. A pesar de que las fichas técnicas incluyen la contraindicación de uso de las vacunas antigripales en estos pacientes, se considera que los pacientes con alergia grave al huevo pueden ser vacunados en centros sanitarios con experiencia en el reconocimiento y tratamiento de reacciones alérgicas graves y cualificados para realizar una resucitación cardiopulmonar.

Recomendaciones vacunación antigripal Andalucía 2019-2020



Precauciones

- **Alergia al huevo:**

Actualmente, se recomienda actuar según la historia previa de alergia al huevo:

- Los sujetos con reacciones leves al huevo, como urticaria, pueden ser vacunados de la gripe. Pueden recibir cualquiera de las vacunas disponibles.
- Personas con reacciones graves tras la toma de huevo como angioedema, dificultad respiratoria o síntomas que hayan requerido adrenalina, pueden ser vacunadas con cualquiera de las vacunas disponibles, pero deberán ser vacunadas en centros, no necesariamente hospitalarios, con medios y preparación para atender eventuales reacciones graves.

Recomendaciones vacunación antigripal Andalucía 2019-2020



Precauciones

Se recomienda seguir las siguientes precauciones:

- **Personas con trastornos de la coagulación y en tratamiento con anticoagulantes:** tienen mayor riesgo de sangrado tras una inyección intramuscular. Para favorecer la hemostasia se debe hacer presión sobre la zona de punción, sin frotar, durante al menos 2 minutos. Se debe advertir a estas personas sobre la posible formación de hematomas y sobre la utilidad del hielo y la inmovilización.

Recomendaciones vacunación antigripal Andalucía 2019-2020



Precauciones


- **Desarrollo de una púrpura trombocitopénica inmune en los 7 días siguientes a haber recibido la vacuna antigripal inactivada:** podría considerarse una precaución para la administración de futuras dosis, por el riesgo de recurrencia.
- **Personas que desarrollaron un síndrome de Guillain-Barré dentro de las 6 semanas posteriores a una vacunación antigripal previa.** En niños sanos se recomienda no vacunar, pero se debe valorar en aquellos con enfermedades de base, ya que en estos niños los beneficios superan al riesgo.

Recomendaciones vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

Administración simultánea con otras vacunas


Durante la campaña, aprovechando la oportunidad vacunal, se recomienda revisar y actualizar el calendario de vacunaciones de todas las personas con indicación de inmunización antigripal.

Se debe revisar el estado de vacunación frente a **neumococo**, por si precisa la administración de la vacuna conjugada 13-valente (**Prevenar 13®**) o la no conjugada polisacáridica 23-valente (**Pneumovax®**), según la [instrucción DGSPyOF-3/2019 sobre vacunación frente a neumococo](#) emitida el 4 julio 2019.




Se recuerda que, en caso de no haber recibido aún la vacuna conjugada 13-valente (Prevenar 13®), se recomienda su administración a aquellas personas de 65 años (nacidas a partir del 1 de enero de 1954) y a aquellas pertenecientes a los grupos de riesgo de enfermedad neumocócica, independientemente de la edad, definidos en la instrucción mencionada.

Recomendaciones vacunación antigripal Andalucía 2019-2020



Puede administrarse de forma concomitante la vacuna antigripal (cualquiera de las tres disponibles para esta campaña) con la vacunación frente a neumococo (tanto Prevenar 13[®] como Pneumovax[®]), siempre en extremidades distintas y con agujas diferentes.

Recomendaciones vacunación antigripal Andalucía 2019-2020



Se recuerda también que, según la misma instrucción DGSPyOF-3/2019, aquellas personas que no tengan factores de riesgo de enfermedad neumocócica invasora definidos en dicha instrucción, no deben recibir la vacuna polisacáridica 23-valente (Pneumovax®), aunque tengan 65 años o más.



CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Estructura orgánica

Áreas de actividad

Servicios y trámites

Act

 La Junta > Salud y Familias > Áreas de actividad > Salud a lo largo de la vida > Programas de salud

Vacunas

- Vacunación Infantil
- Vacunación frente a neumococo
- Campañas de vacunación
- ➔ • Vacuna frente a la Gripe
 - Vacúnate frente a la Hepatitis A
- Vacunación frente a sarampión
- Más Información



Servicio Andaluz de Salud Escuela Andaluza de Salud Pública
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS



Material Informativo para la Campaña de Vacunación frente a la Gripe 2019-2020



Ideas clave para la Campaña de Vacunación frente a la Gripe 2019-2020

Ampliar las **estrategias para campañas** de vacunación frente a la gripe con un enfoque preventivo claro, innovador y unificado en su mensaje.

Promover una mayor **homogeneidad en la prácticas y en el mensaje preventivo**: ejecución, gestión, registro, seguimiento de campañas, etc

Reforzar la **coordinación** entre las autoridades sanitarias, las asociaciones y los profesionales de las diferentes categorías implicados en la vacunación.

Potenciar la **actitud positiva** de los profesionales sanitarios hacia la vacunación, informar adecuadamente a la población utilizando todas las herramientas de comunicación disponibles.

Material de apoyo para la Campaña vacunación frente a la Gripe 2019-2020



Se han elaborado **5 Carteles** - **1 Tríptico** - **1 Vídeo (versión *spot* y completa)** **de información general** acerca de los beneficios de la vacunación en los grupos diana de la Campaña de vacunación frente a la Gripe.

Con el fin de lograr una amplia difusión acerca de la importancia de la vacunación antigripal:

- Se distribuirán más de **50.000** carteles y **60.000** trípticos a través de las Delegaciones Territoriales provinciales.
- Este material estará disponible en la Web de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
- Se utilizarán todas las redes sociales corporativas para garantizar la difusión de los mensajes preventivos.

#AndaluciaSeVacuna #yosimevacuno



@saludand



@Saludandalucia



@saludand



HAY COSAS "MUY NUESTRAS"
QUE LA VACUNA
DE LA
GRIPE
SEA UNA DE ELLAS



Si tienes 65 años o más



Si padeces alguna enfermedad crónica



Si estás embarazada



Si eres profesional sanitario

PIDE CITA YA EN TU CENTRO DE SALUD
Y SI TIENES 65 AÑOS O MÁS EN:



SaludResponde
955 545 060

¡vacúnate!

#AndaluciaSeVacuna #yosimevacuno



@saludand




@Saludandalucia



@saludand



JUNTA DE ANDALUCÍA
COMISIÓN DE SALUD Y FAMILIA



Si tienes 65 años o más



Si padeces alguna enfermedad crónica



Si estás embarazada



Si eres profesional sanitario

PIDE CITA YA EN TU CENTRO DE SALUD
Y SI TIENES 65 AÑOS O MÁS EN:



SaludResponde
955 545 060

¡vacúnate!

#AndaluciaSeVacuna #yosimevacuno



@saludand



@Saludandalucia



@saludand



JUNTA DE ANDALUCÍA
COMISIÓN DE SALUD Y FAMILIA



Si tienes **65 años o más**



Si padeces alguna **enfermedad crónica**



Si estás **embarazada**



Si eres **profesional sanitario**

**PIDE CITA YA EN TU CENTRO DE SALUD
Y SI TIENES 65 AÑOS O MÁS EN:**



SaludResponde
955 545 060

jvacúnate!

#AndaluciaSeVacuna #yosimevacuno

@saludand @Saludandanducia @saludand



Si tienes **65 años o más**



Si padeces alguna **enfermedad crónica**



Si estás **embarazada**



Si eres **profesional sanitario**

**PIDE CITA YA EN TU CENTRO DE SALUD
Y SI TIENES 65 AÑOS O MÁS EN:**



SaludResponde
955 545 060

jvacúnate!

#AndaluciaSeVacuna #yosimevacuno

@saludand @Saludandanducia @saludand





HAY COSAS "MUY NUESTRAS"
QUE LA VACUNA
DE LA
GRIPE
SEA UNA DE ELLAS



SI TIENES 65 AÑOS O MÁS, ESTÁS EMBARAZADA, PADECES ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA
O ERES PROFESIONAL SANITARIO...

¡vacúnate!

#AndaluciaSeVacuna #yosimevacuno



@saludand



@saludandalucia



@saludand



LA MEJOR PREVENCIÓN ES LA VACUNACIÓN

¿Qué es la gripe?

Es una **enfermedad vírica altamente contagiosa** y que produce epidemias cada año.

Como la gripe es una enfermedad causada por un virus, los antibióticos no resultan efectivos para combatirla y su uso puede crear resistencias a estos fármacos. El **tratamiento efectivo** consiste en **reposo, hidratación adecuada**, y si fuese necesario, algún medicamento para paliar los síntomas.

Gripe de diferentes "tipos"

Hay tres tipos de virus de la gripe que afectan a los seres humanos:

- A B** Causan epidemias estacionales en invierno
- C** Causan infecciones respiratorias leves y se detectan con menor frecuencia



El virus tiene el poder de cambiar su estructura continuamente, y por eso las vacunas que nos protegen son revisadas cada año.

¿CÓMO SE CONTAGIA LA GRIPE?

El virus de la gripe **se transmite con facilidad de persona a persona a través de gotitas de saliva** que expulsamos al toser, estornudar o hablar y por **propagación indirecta al entrar en contacto** con manos u otros objetos contaminados.



No compartir
bebidas o utensilios



Taparse la boca con un pañuelo o
con el codo al toser o estornudar

MEDIDAS HIGIÉNICAS A TENER EN CUENTA PARA EVITAR LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS DE LA GRIPE



Lavarse las manos
con frecuencia



Usar pañuelos desechables

UNA ENFERMEDAD CON SÍNTOMAS CONOCIDOS

El tiempo desde la entrada del virus en la persona y el inicio de los primeros síntomas de la gripe suele variar de 1 a 5 días.

El comienzo de los síntomas suele ser brusco, con **fiebre, malestar general, síntomas respiratorios** (tos, congestión nasal), **dolor de cabeza, dolores articulares y musculares** y, a veces, **síntomas digestivos** (vómitos, diarrea).

Ante estos síntomas, debe acudir a su médico si:

- > No desaparece la **fiebre** pese al tratamiento
- > Presenta **dificultades para respirar** estando en reposo
- > Tiene **tos persistente** pasados **10 días**

Es importante realizar un **uso adecuado y responsable de los servicios sanitarios** para evitar su saturación y garantizar una asistencia adecuada. Hay que hacer uso de **las urgencias solo en los casos de gravedad**.

DIFERENCIAS ENTRE GRIPE Y RESFRIADO

| | INICIO | Brusco | Paulatino |
|--|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | DURACIÓN | 3-7 días | 8-10 días |
| | FIEBRE | Moderada-alta | Sin fiebre o baja |
| | DOLOR MUSCULAR | Sí | No |
| | DOLOR DE CABEZA | Intenso | Raramente |
| | TOS | Seca | Con mocos |
| | FATIGA | Intensa durante 2 semanas | Moderada |
| | SECRECIÓN NASAL | A veces | Sí |
| | ESTORNUDOS | Raramente | Sí |
| | IRRITACIÓN OCULAR | Raramente | Frecuentemente |

¿QUIÉN DEBE VACUNARSE?



Si tienes 65 años o más

Estas personas tienen más posibilidades de padecer una gripe grave y que tengan que ingresar en el hospital, sobre todo por complicaciones respiratorias. En esta edad, la gripe es una de las 10 principales causas de fallecimiento.

Es muy importante que se vacunen frente a la gripe todos los años. Se hace especial énfasis en aquellas personas que viven en instituciones cerradas.



Personas con enfermedades crónicas en riesgo o personas que tengan contacto con ellas

Las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, sobre todo de pulmón, corazón, diabetes, etc., y las que tienen problemas de defensas (ej. cáncer, inmunodeprimidos), tienen un alto riesgo de tener complicaciones graves con la gripe o que empeore su enfermedad.

Es importante que se vacunen, a partir de los 6 meses de edad, todos los años, tanto las personas con enfermedades crónicas como sus convivientes.



Embarazadas, en cualquier trimestre de la gestación

La vacuna frente a la gripe es segura en cualquier trimestre del embarazo. Previene complicaciones de la gripe tanto a la mujer embarazada como a su bebé durante los primeros meses de vida, al pasarle las defensas que produce la vacunación.



Profesionales sanitarios

Están más expuestos que cualquier otro colectivo al virus de la gripe, con lo que el riesgo es mayor.

La transmisión del virus a través del personal sanitario puede originar numerosos casos de gripe entre otros compañeros de trabajo y los pacientes.

Su ejemplo sirve a la población general para tomar conciencia sobre la importancia de la vacunación y aumentar la confianza en ella.

DESMONTANDO MITOS SOBRE LA GRIPE

- ✓ La vacuna de la gripe no puede causarle gripe porque se fabrica con pequeños fragmentos de virus muertos.
- ✓ En la zona del pinchazo puede aparecer: enrojecimiento, inflamación, dolor e induración que puede durar hasta 2 días.
- ✓ La vacuna de la gripe puede producir, aunque de forma muy poco frecuente y como cualquier vacuna: dolor de cabeza, muscular, fiebre, malestar, escalofríos, normalmente de tipo leve y de menos de 24-48 horas.
- ✓ La vacuna de la gripe es segura, y así lo confirman los estudios y los análisis anuales de las autoridades sanitarias, que permiten su comercialización.
- ✓ En adultos, la vacuna frente a la gripe puede administrarse a la vez que otras vacunas.
- ✓ A los niños se les puede administrar la vacuna de la gripe el mismo día que las vacunas del calendario.

La vacunación es una medida eficaz para prevenir la gripe y una responsabilidad individual y colectiva para conseguir que todos estemos protegidos frente a esta enfermedad.



HAY COSAS "MUY NUESTRAS" QUE LA VACUNA DE LA GRIPE SEA UNA DE ELLAS

SI TIENES 65 AÑOS O MÁS, ESTÁS EMBARAZADA, PADECES ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA O ERES PROFESIONAL SANITARIO...

Este año ... #AndalucíaSeVacuna
#yosimevacuno

¡vacúnate!



@saludand
@Saludandalucia
@saludand

¡vacúnate!



@saludand
@Saludandalucia
@saludand

¡vacúnate!





Campaña GRIPE

Con la vacuna
yo me protejo
y te protejo
frente
a la **GRIPE**

Recuerda vacunarte también frente a la tosferina en el tercer trimestre

Consulta a tu médico



#AndalucíaSeVacuna
#yosimevacuno



SaludResponde
955 545 060

VIDEOS CAMPAÑA



Grupos de riesgo vacunación
gripe 2

0 visualizaciones •
Hace 18 horas



Grupos de riesgo vacunación
gripe

0 visualizaciones •
Hace 18 horas



¿Qué es la gripe?

0 visualizaciones •
Hace 18 horas


Cuenta Consejería de Salud y Familias:

<https://www.youtube.com/user/Saludand>

Enlace a vídeo de la campaña:

<https://www.youtube.com/watch?v=clCRy8jdl50&t=0s>


Grupo Andaluz Vacunación AntiGripal



Córdoba, Delegación Territorial de Salud y Familias
25 octubre 2019

Escuela Andaluza de Salud Pública
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Coberturas vacunales



Coberturas vacunales Gripe, Andalucía 2018-2019:



| CCAA | ≥65 AÑOS | | |
|--------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Nºvacunados | Población diana | Cobertura (%) |
| Andalucía | 668.921 | 1.363.914 | 49,0 |
| Aragón | 149.416 | 275.485 | 54,2 |
| Asturias | 145.060 | 259.935 | 55,8 |
| Baleares | 73.820 | 177.667 | 41,5 |
| Canarias* | 164.942 | 314.677 | 52,4 |
| Cantabria* | 64.276 | 124.586 | 51,6 |
| Castilla y León* | 368.866 | 603.839 | 61,1 |
| Castilla-La Mancha | 217.586 | 370.214 | 58,8 |
| Cataluña* | 725.635 | 1.421.421 | 51,0 |
| C.Valenciana | 487.729 | 937.432 | 52,0 |
| Extremadura* | 128.985 | 216.570 | 59,6 |
| Galicia* | 394.442 | 672.930 | 58,6 |
| Madrid* | 645.402 | 1.126.487 | 57,3 |
| Murcia* | 117.328 | 224.586 | 52,2 |
| Navarra* | 75.458 | 126.222 | 59,8 |
| País Vasco | 285.335 | 492.040 | 58,0 |
| La Rioja * | 41.590 | 64.426 | 64,6 |
| Ceuta | 2.768 | 9.296 | 29,8 |
| Melilla | 4.067 | 9.101 | 44,7 |
| TOTAL | 4.761.626 | 8.790.828 | 54,2 |

*CCAA que ofertan la vacunación a los 60 años

≥ 65 años

49%

Coberturas vacunales Gripe Andalucía 2018-2019:

| | TRABAJADORES SANITARIOS | SANITARIOS VACUNADOS | % VACUNADOS |
|-----------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| ALMERIA | 5.787 | 1.446 | 25,0% |
| CADIZ | 12.829 | 3.049 | 23,8% |
| CORDOBA | 9.131 | 2.431 | 26,6% |
| GRANADA | 11.875 | 3.488 | 29,4% |
| HUELVA | 5.132 | 1.087 | 21,2% |
| JAEN | 6.651 | 2.321 | 34,9% |
| MALAGA | 14.832 | 4.145 | 27,9% |
| SEVILLA | 20.161 | 6.423 | 31,9% |
| ANDALUCIA | 86.398 | 24.390 | 28,2% |

Personal sanitario

28%

Fuente: Módulo Vacunas 5.0 / BDU


Coordinación de Gestión y Evaluación
Subdirección de Gestión Sanitaria

Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud

Coberturas vacunales Gripe, Andalucía 2018-2019:

| | MUJERES EMBARAZADAS* | EMBARAZADAS VACUNADAS | % VACUNADAS |
|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| ALMERIA | 5.547 | 2.233 | 40,3% |
| CADIZ | 7.514 | 2.018 | 26,9% |
| CORDOBA | 4.761 | 2.896 | 60,8% |
| GRANADA | 5.810 | 3.229 | 55,6% |
| HUELVA | 3.340 | 1.295 | 38,8% |
| JAEN | 3.640 | 1.956 | 53,7% |
| MALAGA | 10.048 | 5.043 | 50,2% |
| SEVILLA | 12.885 | 6.123 | 47,5% |
| ANDALUCIA | 53.545 | 24.793 | 46,3% |

Embarazadas



Fuente: Módulo Vacunas 5.0 / BDU
Recién nacidos noviembre-diciembre 2018 y de enero a julio 2.019

Coordinación de Gestión y Evaluación
Subdirección de Gestión Sanitaria

Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud

Recomendaciones vacunación antigripal Andalucía 2019-2020

Objetivos de la campaña antigripal

Para la temporada 2019-2020, se proponen los siguientes **objetivos**:

- **En el grupo de edad mayor o igual a 65 años:** alcanzar o superar una cobertura de vacunación del 65%.
- **En el grupo de profesionales sanitarios y en el de embarazadas:** alcanzar o superar una cobertura de vacunación del 40%.
- **Realizar actividades de información y formación,** dirigidas a los profesionales sanitarios y a los ciudadanos, sobre la campaña de vacunación frente a la gripe, en el 100% de los distritos y áreas.

La finalidad es avanzar progresivamente y alcanzar el objetivo establecido por la Organización Mundial de la Salud y por la Comisión Europea de lograr coberturas de, al menos, el 75% en el grupo de mayores tan pronto como sea posible y aumentar las coberturas de vacunación en profesionales sanitarios y grupos de riesgo.

CONSEJERIA DE SALUD Y FAMILIAS. DIRECCION DE SALUD
PUBLICA Y ORDENACION FARMACEUTICA

SOCIEDADES CIENTIFICAS

- **AAM** (ASOCIACION ANDALUZA DE MATRONAS)
- **AAMST** (ASOCIACION ANDALUZA DE MEDICINA Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO)
- **AEEMT** (ASOCIACION ESPAÑOLA DE ESPECIALISTAS EN MEDICINA DEL TRABAJO)
- **AEV** (ASOCIACION ESPAÑOLA DE VACUNOLOGIA)
- **ANDAPAP** (ASOCIACION ANDALUZA DE PEDIATRIA DE ATENCION PRIMARIA)
- **ANENVAC** (ASOCIACION NACIONAL DE ENFERMERIA Y VACUNAS)
- **ASANEC** (ASOCIACION ANDALUZA DE ENFERMERIA COMUNITARIA)
- **GAIP** (GRUPO ANDALUZ DE INFECTOLOGIA E INMUNOPATOLOGIA PEDIATRICA)
- **NEUMOSUR** (ASOCIACION DE NEUMOLOGIA Y CIRUGIA TORACICA DEL SUR)
- **SADEMI** (SOCIEDAD ANDALUZA DE MEDICINA INTERNA)
- **SAEI** (SOCIEDAD ANDALUZA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS)
- **SAEPI** (SOCIEDAD ANDALUZA DE EPIDEMIOLOGIA)
- **SAFH** (SOCIEDAD ANDALUZA DE FARMACEUTICOS DE HOSPITALES Y CENTROS SOCIOSANITARIOS)
- **SAGG** (SOCIEDAD ANDALUZA DE GERIATRIA Y GERONTOLOGIA)
- **SAGO** (SOCIEDAD ANDALUZA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA)
- **SAMFYC** (SOCIEDAD ANDALUZA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA)
- **SAMG** (SOCIEDAD ANDALUZA DE MEDICOS GENERALES)
- **SAMPAC** (SOCIEDAD ANDALUZA DE MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA CLINICA)
- **SAMPSP** (SOCIEDAD ANDALUZA DE MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA)
- **SEFAC** (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA FAMILIAR Y COMUNITARIA)
- **SEFAP** (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACEUTICOS DE ATENCION PRIMARIA). SECCION ANDALUCIA ORIENTAL; SECCION ANDALUCÍA OCCIDENTAL
- **SEMERGEN-ANDALUCIA** (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICOS DE ATENCION PRIMARIA)
- **SPAO** (SOCIEDAD DE PEDIATRIA DE ANDALUCIA ORIENTAL)
- **SPAORYEX** (SOCIEDAD DE PEDIATRIA DE ANDALUCIA OCCIDENTAL Y EXTREMADURA)

COLEGIOS OFICIALES

- **CONSEJO ANDALUZ DE ENFERMERIA**
- **CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACEUTICOS**
- **CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MEDICOS**

Grupo Andaluz
Vacunación
AntiGripal






Escuela Andaluza de Salud Pública
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Metodología de Trabajo para los grupos

Dos documentos, para presentar en la reunión del día **25 de octubre**:

- **Consenso** global a favor de la vacunación antigripal
- **Decálogo de acciones** concretas a realizar, con el compromiso de todos los participantes para su implementación durante la campaña de vacunación 2019-2020



Metodología de Trabajo para los grupos

Fase 2: Priorización de ideas (online):



Importancia (0-10): Poder para responder a los problemas actuales relacionado con la vacunación y en razón a su potencia para aumentar la cobertura de la vacunación antigripal

Factibilidad (0-10): Posibilidad de cada propuesta para ser llevada a cabo teniendo en cuenta la situación (recursos existentes, aspectos estructurales, etc)

**Grupo Andaluz
Vacunación
AntiGripal**




DECÁLOGO DEL GAVAG

**LAS 10 MEDIDAS DE MAYOR IMPORTANCIA Y FACTIBILIDAD
A REALIZAR DURANTE LA CAMPAÑA DE
VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2019-2020 EN ANDALUCIA**

Resultados de la encuesta

- Ideas: 154
- Participantes: 42
- Tasa de respuesta: 70%
- Amplio consenso



DECÁLOGO DEL GAVAG

**LAS 10 MEDIDAS DE MAYOR IMPORTANCIA Y FACTIBILIDAD
A REALIZAR DURANTE LA CAMPAÑA DE
VACUNACIÓN ANTIGRIPIAL 2019-2020 EN ANDALUCIA**

**Grupo Andaluz
Vacunación
AntiGripal**




Transversales y para personas con patologías crónicas o de 65 años o más.

Embarazadas

Profesionales sanitarios

OTRAS MEDIDAS

Grupo Andaluz Vacunación AntiGripal



Gracias a todos

Servicio Andaluz de Salud Escuela Andaluza de Salud Pública
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS



GAVAG

Grupo Andaluz
Vacunación
AntiGripal

Servicio Andaluz de Salud Escuela Andaluza de Salud Pública
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS



GAVAG

Grupo Andaluz
Vacunación
AntiGripal

Servicio Andaluz de Salud Escuela Andaluza de Salud Pública
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

